



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural**

TSA OVÍ I CABRUM- 18 maig

**Situació actual Verola Ovina Caprina
(Castella La Manxa i Andalusia)**

Carles Sánchez Martí
Secció de Vigilància, Lluita i Control de les Malalties dels Animals
Servei de Prevenció en Salut Animal

Situació Verola Ovina i Caprina

Detecció VOC a l'Estat:

- **Primer focus al 19/09/2022 a Granada**
- **El 26/09/2022 de Granada salta a Conca**
Moviment de xais

S'estableixen dues zones de control

- **Andalusia**
- **Castella la Manxa**



Situació Verola Ovina i Caprina

VOC a Andalusia

- Primer focus al 19/09/2022 a Granada
- Un total de 13 focus entre 19/09/ i 08/11/2022
- Només afectades explotacions de reproductores de carn.
- ZR fins el 14/12/2022
- ZRA fins el 16/01/2023
- No nous casos.
- **MESURES AIXECADES**



Situació Verola Ovina i Caprina

VOC a Castella la Manxa

- Primer focus al 26/09/2022 a un engreix de Conca
- Comportament de la malaltia en el temps:
 - Entre 26/09 i 13/10 es donen 8 focus. Afectació engreix i reproductores del llet
 - 29/11. 2 focus explotacions de llet
 - Entre 23/1 i 07/02. 3 focus explotacions de llet
 - 22/03 i 10/04. 3 focus explotacions de llet
 - **NOU FOCUS 17/05 en una explotació de llet**

45 dies


56 dies

45 dies

37 dies



Situació Verola Ovina i Caprina



<u>Focus VOC</u> <u>2022/23</u>	Focus	Reproductors carn	Reproductors llet	engreix
GRANADA	12/0	1.979		
ALMERIA	1/0	100		
CONCA	10/3		23.240	12.000
CIUDAD REAL	0/4		13.816	
	23/07			



Situació Verola Ovina i Caprina

VOC a Castella la Manxa

- Salts de la malaltia cada cada 45 dies aprox.
- Es visiten explotacions que no es detecten símptomes i al cap d'unes setmanes apareixen els brots.
- La malaltia passa desapercebuda en visites inicials



- **IMPORTANT MÀXIMA COLLABORACIÓ RAMADER**
Qui millor pot detectar simptomatologia inicial
- **Afectació 37.000 ovelles de llet !!!! i 11.000 xais engreix**



Situació Verola Ovina i Caprina

LA VIRUELA OVINA Y CAPRINA
ES UNA ENFERMEDAD MUY GRAVE QUE HA APARECIDO
EN ESPAÑA Y AFECTA A GANADO OVINO Y CAPRINO
EN NINGÚN CASO SE TRANSMITE A LOS SERES HUMANOS

¿Cómo podemos saber si nuestras ovejas o cabras pueden haber contraído la enfermedad?

1 Examine diariamente a los animales de su granja; **principalmente las ovejas, pero también las cabras**

- > En la **cabeza**
- > En el **abdomen**
- > En el **pecho**
- > En las **axilas**
- > En el **área genital**
- > En la **base y bajo la cola**
- > En el **muslo**
- > En **cualquier otra parte del cuerpo del animal sin lana**



2 Buscar cuidadosamente lesiones de estos tipos:

- Enrojecimiento, vesículas llenas de líquido, o bien rotas con puntos rojos de la piel, otras heridas, lesiones cicatrizadas en forma de puntos negros, llagas



Oveja con extensas lesiones en forma de pápula (similares a granos rojos) distribuidos por todo el cuerpo, en especial en la zona del abdomen



Lesiones en forma de pápulas en la base y debajo de la cola



Lesiones granulares en forma de pápula



Lesiones características en órganos internos (hígado, pulmón...)



Lesiones erosionadas y en fase de cicatrización en el hocico



Lesiones avanzadas, en fase de cicatrización, distribuidas por todo el cuerpo y abdomen



Lesiones granulares en forma de pápulas distribuidas por el abdomen y la zona inguinal



Lesiones en forma de vesículas y pápulas en la base del muslo


3 SI SE DETECTA CUALQUIERA DE ESTOS SÍNTOMAS O LESIONES COMPATIBLES CON LA ENFERMEDAD **COMUNIQUE FORMA INMEDIATA A LOS SERVICIOS VETERINARIOS OFICIALES ESTOS HALLAZGOS Y SIGA SUS INSTRUCCIONES**

VIGILÀNCIA
PASSIVA?

IMPORTANT



Situació Verola Ovina i Caprina



**RECORDAR
IMPORTÀNCIA:
BIOSEGURETAT I
VIGILÀNCIA PASSIVA**



Ajuts a la reposició

Moltes gràcies per la vostra atenció

carlos.sanchez@gencat.cat
salutanimal.daam@gencat.cat



Generalitat de Catalunya
Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural